幽门螺杆菌核酸及耐药突变位点检测试剂盒

Helicobacter pylori nucleic acid and drug resistance mutation site detection kit

应用多重荧光PCR技术,同时检测幽门螺杆菌是否感染和对多种抗生素是否耐药
(克拉霉素、喹诺酮类抗生素、阿莫西林、四环素、呋喃唑酮)

- 迅速
- 灵敏
- 准确
- 便捷

一步到胃 无幽无虑

精准性检测耐药 ⊕ 个体化用药指导

幽门螺杆菌核酸及耐药突变位点检测试剂盒

Helicobacter pylori nucleic acid and drug resistance mutation site detection kit

> 产品名称

幽门螺杆菌核酸及耐药突变位点检测试剂盒

应用多重荧光PCR技术,同时检测幽门螺杆菌是否感染和对多种抗生素(克拉霉素、喹诺酮类抗生素、阿莫西林、四环素、呋喃唑酮)是否耐药

> Hp感染的危害

我国幽门螺杆菌 (*Helicobacter pylori*, Hp) 感染者近8亿人, Hp感染可引起慢性胃炎、消化性溃疡、萎缩性胃炎等疾病, 是胃癌的主要病因, 感染后机体难以自发清除, 规范化治疗根除Hp可有效预防胃癌¹。

(中国幽门螺杆菌根除与胃癌防控的专家共识意见(2019年, 上海))

> Hp感染的根除治疗

国内外指南/共识推荐Hp检测结果呈阳性的患者均应接受根除治疗^{2,3}。

《ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection》(美国ACG指南)(2017)、《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》(2017)

根除Hp前,需检测Hp对抗生素的耐药情况,根据检测结果,精准指导用药,避免根除失败和反反复复用药。

精准检测更省力 用药方案七选一

《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》推荐Hp根除四联方案中抗菌药物的组合、剂量和用法^a

方案	抗菌药物 1	抗菌药物 2
1	阿莫西林1000mg,2次/d	克拉霉素500mg,2次/d
2	阿莫西林1000mg,2次/d	左氧氟沙星500mg,1次/d或200mg,2次/d
3	阿莫西林1000mg,2次/d	呋喃唑酮100mg,2次/d
4	四环素500mg,3次/d或4次/d	甲硝唑400mg,3次/d或4次/d
5	四环素500mg,3次/d或4次/d	呋喃唑酮100mg,2次/d
6	阿莫西林1000mg,2次/d	甲硝唑400mg,3次/d或4次/d
7	阿莫西林1000mg,2次/d	四环素500mg,3次/d或4次/d

注: ^a 标准剂量(PPI + 铋剂)(2次/d,餐前半小时口服) + 2种抗菌药物(餐后口服)。标准剂量PPI为艾司奥美拉唑20mg、雷贝拉唑10mg(或20mg)、奥美拉唑20mg、兰索拉唑30mg、泮托拉唑40mg、艾普拉唑5mg,以上选一;标准剂量铋剂为枸橼酸铋钾220mg(果胶铋标准剂量待确定)

> 选择敏感的抗生素,可显著提高Hp根除率

如果Hp不耐药,2周疗程的根除率>90%,而耐药时根除率则降至50%以下⁴。

(Graham D Y, Dore M P. Helicobacter pylori therapy: a paradigm shift[J]. Expert Review of Anti-infective Therapy, 2016:577-585.)

耐药菌株感染者, 三联疗法根除率显著下降

- > PPI
- > 阿莫西林
- > 克拉霉素

- > PPI
- > 阿莫西林
- > 左氧氟沙星

- > PPI
- > 阿莫西林
- > 甲硝唑

疗程14天, 根除率<50%

敏感菌株感染者, 三联疗法仍然有很高根除率

- > PPI
- > 阿莫西林
- > 克拉霉素

- > PPI
- > 阿莫西林
- > 左氧氟沙星

- > PPI
- > 阿莫西林
- > 甲硝唑

疗程14天, 根除率>95%

国内外指南 / 共识推荐利用基因检测方法进行耐药检测 2, 3, 5

- 《Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V/Florence Consensus Report》(马五共识) (2017)
- 《ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection》(美国ACG指南) (2017)
- 《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》(2017)

产品方法学优势

Hp耐药检测方法	Hp培养与药敏试验	VS	Hp耐药突变基因检测 ✓
检测时间	耗时较长, 需要7-10天的时间		检测时间短, 2个小时完成检测
检测过程	Hp培养难度大, 生长条件严苛, 在培养过程中, 操作过程中稍不注意, 就会导致菌株死亡		操作简便, 只需要完成样本核酸提取和加样上机即可, 仪器会自动完成检测
灵敏度	灵敏度一般, 当存在混合菌株感染时, 容易产生假阴性		灵敏度较高
临床应用	由于操作难度大、耗时久, 不推荐用于Hp常规诊断, 仅在Hp反复治疗失败的情况下使用		可用于早期诊断, 根据耐药检测结果, 指导临床针对用药, 提高Hp的根除治疗成功率

幽门螺杆菌核酸及耐药突变位点检测试剂盒

Helicobacter pylori nucleic acid and drug resistance mutation site detection kit

精准性检测耐药

个体化用药指导

产品简要信息

【包装规格】50测试/盒

【储存条件及有效期】-(20±5)°C冰箱内,保存期12个月。采用泡沫盒加冰袋或干冰密封进行运输。

【样本要求】采集的样本为慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡等幽门螺杆菌感染或疑似感染患者的胃黏膜组织。样本采集过程中注意无菌操作。将样本置于样本保存裂解液(货号:P031T050A0C0)中,常温状态下贮存和运输可保存7天。

参考文献

- 1.中国幽门螺杆菌根除与胃癌防控的专家共识意见(2019年,上海)[J]. 中华消化杂志, 2019, 39(005):310-316.
2. Chey, William, D, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection (vol 112, pg 212, 2017)[J]. American Journal of Gastroenterology, 2018.
- 3.第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 胃肠病学, 2017(6).
- 4.Graham D Y , Dore M P . Helicobacter pylori therapy: a paradigm shift[J]. Expert Review of Anti-infective Therapy, 2016:577-585.
5. Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V/Florence Consensus Report[J]. Gut, 2017.

江苏默乐生物科技股份有限公司

江苏.泰州

江苏省泰州市医药高新区健康大道805号G116幢6-7层

0523-8608 0606

浙江.杭州

浙江省杭州市余杭区文一西路1500号健康谷5号楼4-5层

0571-8720 9308